

**Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц, раствор  
Границен производ**

**УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА**

Пред употреба на граничниот производ, внимателно прочитајте го упатството.

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Советувајте се со Вашиот лекар/фармацевт ако Ви се потребни дополнителни информации.

Упатството содржи:

1. Што претставува и за што се употребува граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц,
2. Што треба да се знае пред употребата на граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц,
3. Како се употребува граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц,
4. Можни несакани дејства на граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц,
5. Чување и рок на употреба на граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц и
6. Дополнителни податоци за граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц.

**1. Што претставува и за што се употребува граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц**

Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц е раствор за перорална употреба. Придонесува во олеснување на дразнењето на горните дишни патишта и во нормалната функција на имуниот систем.

Екстрактот од тегавец (*Plantago lanceolata*) придонесува во олеснување на дразнењето на горните дишни патишта.

Витаминот Ц (аскорбинската киселина) придонесува за нормалната функција на имуниот систем, намалување на заморот и исцрпеноста.

Екстрактот од ехинацеа (*Echinacea purpurea*) придонесува во нормалната функција на имуниот систем.

**2. Што треба да се знае пред употребата на граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц**

***Немојте да го земате граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц***

Ако сте алергични или пречувствителни на некоја од состојките на производот.

Не се препорачува употреба при прогресивни системски болести (ТБЦ, леукемија), автоимуни болести, сида, бременост, доење и кај деца под 3 години.

***Бидете посебно внимателни со граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц***

Нема посебни мерки на препазливост.



1

A handwritten signature is written over the official stamp. The signature is in blue ink and appears to be a personal or professional identifier.

**Бременост и доење**

Побарајте совет од Вашиот лекар или фармацевт пред употреба на било каков производ.

Не се препорачува употреба при бременост и доење.

**Влијание врз способноста на возење автомобил/ракување со машини**

Не е забележано влијание на граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц врз психофизичките способности и на способноста за возење и работа со машини.

**Важни информации за некои ингредиенти на граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц**

Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц содржи сорбитол и малтитол сируп. Сорбитолот и малтитол сирупот може да имаат благо лаксативно дејство.

**Земање/употреба на други медицински производи**

Не е забележано взајемно делување со други медицински производи.

**3. Како се употребува граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц**

Секогаш употребувајте го граничниот производ според препораките дадени во ова упатство или како што Ви препорачал Вашиот лекар/фармацевт.

**Начин на употреба**

За перорална употреба (се пие).

**Дозирање**

Деца од 3-6 години:  $\frac{1}{2}$  чајна лажичка (2,5 ml) три пати на ден.

Училишни деца: 1 чајна лажичка (5 ml) три пати на ден.

Возрасни: 1 супена лажица (15 ml) три пати на ден.

Не се препорачува континуирана употреба подолго од 2 недели.

Ве молиме да се придржувате до препорачаните дневни дози.

Без додаден алкохол и шеќер. Погоден е за употреба и кај дијабетичари.

**Ако сте употребиле повеќе од препорачаното**

Ако сте зеле поголема доза од препараторот отколку што треба, веднаш посоветувајте се со Вашиот лекар/фармацевт.

Нема наведени податоци за предозирање со овој производ.

Евентуалната прекумерната употреба, може да има лаксативно дејство.

**Ако сте заборавиле да го употребите граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц**

Ако сте пропуштиле доза, земете ја наредната и продолжете со вообичаеното дозирање.

Не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената.

**Ефекти што произлегуваат од прекинување на употребата**

Не се познати.

**4. Можни несакани дејства на граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц**



Како и сите други лекови и медицински производи и граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц може да има несакани дејства, кои не се појавуваат кај сите пациенти.

Досега нема пријави за несакани дејства.

Прекумерната употреба може евентуално да има благо лаксативно дејство.

Ако забележите било какви несакани дејства кои не се споменати во ова упатство, Ве молиме да го информирате Вашиот лекар или фармацевт.

#### **5. Податоци за чување и рок на употреба на граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц**

##### **Начин на чување**

**Да се чува на места недостапни за деца!**

Да се чува на суво и темно место, на температура до 25° С.

##### **Рок на употреба**

Рок на употреба е наведен на пакувањето.

Не го употребувајте производот по датумот на истекот на рокот на употреба наведен на кутијата/блистерот. Рокот на употреба се однесува на последниот ден од наведениот месец.

##### **Не го употребувајте граничниот производ ако сте забележиле**

Промени на растворот или пакувањето.

##### **Одстранување на граничниот производ**

Прашајте го Вашиот фармацевт како да ги отстраните граничните производи кои веќе не Ви се потребни. Овие мерки ќе помогнат да се заштити околната.

Граничните производи не треба да се исфрлаат во отпадна вода ниту во смет од домаќинство.

#### **6. Дополнителни податоци за граничниот производ Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц**

##### **Што содржи Мукоплант тегавец со ехинацеа и витамин Ц**

Состав	100 g	100 ml	Во препорачаната дневна доза			Препорачана дневна количина/доза (ПДК %)	* за деца (4-10 г.)	** за возрасни
			7,5 ml	15 ml	45 ml			
Екстракт од теснолистен тегавец ( <i>Plantago lanceolata</i> )	4,5 g	5,456 g	409,2 mg	818,4 mg	2455,2 mg	/	/	/
Екстракт од виолетова ехинацеа ( <i>Echinacea purpurea</i> )	0,02 g	0,025 g	1,86 mg	3,72 mg	11,16 mg	/	/	/
Етерично масло од црно нане ( <i>Mentha piperita</i> )	0,01 g	0,012 g	0,93 mg	1,86 mg	5,58 mg	/	/	/
Витамин Ц (Ascorbic acid)	0,50 g	0,620 g	46,5 mg (*103 %)	93 mg (**116 %)	279 mg (**349 %)	45 mg	80 mg	

МДК\*-максимална дозволена количина за деца од 4-10 години.

МДК\*\*-максимална дозволена количина за деца над 14 и возрасни.



**Состав:** стабилизатори: сорбитол, малитол сируп; вода; 4,4 % екстракт од лист од тегавец 1:1 (*Plantago lanceolate*); 0,5 % витамин Ц (аскорбинска киселина); конзерванс: калиум сорбат; 0,02 % екстракт од ехинацеа 34-44:1 (*Echinacea purpurea*), етерично масло од црно нане (*Mentha piperita*); малтодекстрин. Без додаден шеќер и алкохол.

**Изглед и големина на пакување**  
Темно стаклено шише x 100 ml/кутија

**Начин на издавање на граничниот производ**  
Граничниот производ се издава и/или продава без рецепт.

**Носител на одобрението за ставање на граничниот производ во промет**  
Натусана Македонија  
ул. Качанички пат бр. 174  
МК-1010 Скопје  
[www.natusana.mk](http://www.natusana.mk)

**Производител на граничниот производ**  
Dr. Theiss Naturwaren GmbH,  
Michelinstrasse 10,  
D-66424 Homburg, Германија  
[www.naturwaren-theiss.de](http://www.naturwaren-theiss.de)

**Број и датум на упис во Регистарот на гранични производи**  
(-----)

**Датум на последна ревизија на упатството**

12.2015

